

Prise en charge des cas de fièvres dans les centres de santé

FIEVRE ou signes évocateurs du paludisme

Fièvre ou antécédents de fièvre, température axillaire $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ non corrigée

Rechercher de signes de gravité/ danger

NON

Effectuer un RDT

POSITIF

- Traiter par ACT
- Donner un antipyrétique pour baisser la température
- Rechercher les autres maladies associées et les traiter

NEGATIF

- Rechercher autres causes de fièvre : pneumonie, diarrhée....
- Prendre en charge les autres causes diagnostiquées

OUI

- Instaurer un traitement d'urgence
- Effectuer RDT

POSITIF

- Donner un traitement pré-transfert :
 - Quinine injectable
 - Antibiotique à large spectre
- Référer

NEGATIF

- Référer

- Enfant de moins de 2 mois et femme enceinte au cours du 1er trimestre
- Référer

FIEVRE ou signes évocateurs du paludisme

Fièvre ou antécédents de fièvre, température axillaire $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ non corrigée

Rechercher de toux

OUI

FR ≥ 50 : 2 à 12 mois
FR ≥ 40 : 12 mois à 5 ans

OUI

PNEUMONIE
Donner antibiotique

NON

Grippe simple
Donner antipyrétique

NON

- Donner antipyrétique
- Surveiller l'évolution de la fièvre
- Au bout de 3 jours, référer si fièvre persiste

NON

Rechercher de diarrhées

OUI

Selles liquides glaireuses ou sanguinolentes ou diarrhées $>15\text{j}$

OUI

Donner antibiotique

NON

Donner antipyrétique